




## ERYTHRONIUM montanum

Hundszahn

Artikel-Nr.: EA197

Portionspreis (meist ausreichend für ca. 50 Pflanzen)	1g-Preis (0,1-9,9g)	10g-Preis (10-99,9g)	100g-Preis (100-999,9g)	1000g-Preis (1000-9999,9g)	10000g-Preis (10000-99999,9g)
6,00€	12,00€	96,00€	768,00€	-	-

### Pflanzenbeschreibung

<b>Lebenszyklus</b>	Staudig
<b>Familie</b>	Liliaceae
<b>Herkunft</b>	Oregon und Washington (USA), Vancouver Island, British Columbia (Kanada)
<b>Besondere Merkmale</b>	Großartige, weiße, sternenförmige Blüten mit leicht gebogenen Blütenblättern. Meist verzweigte Stiele. Exquisite Sorte für Kenner. Sonnig in kälteren Gebieten, Halbschattig anderswo.
<b>Hauptblütenfarbe</b>	(weiß / creme)
<b>Blütenfarbe</b>	Reinweiß
<b>Blütezeit</b>	Mai - Juli
<b>Winterhärtezonen</b>	Z4 - Z8
<b>Belaubung</b>	Oval-lanzettlich
<b>Habitus/Wuchs</b>	horstbildend
<b>Wuchshöhe mit Blüten</b>	20 cm
<b>Pflanzenabstand</b>	25 cm
<b>Bodenansprüche</b>	feucht / sauer
<b>Standort</b>	
<b>Verwendung</b>	für Steingärten geeignet

### Kulturtipps

<b>Tausendkorngewicht</b>	3,57143 Gramm
<b>Samen pro Gramm</b>	280 (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!)
<b>Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen</b>	10 Gramm (Bei Direktaussaat in Töpfe etc. wird eine größere Menge benötigt)
<b>Aussaatmenge / Platten</b>	2 pro Zelle

**Plattengröße(n)**

Aussaatschalen

**Keimanleitung**

(1) Kaltkeimer werden auch heute noch, nicht ganz zutreffend, Frostkeimer genannt. Die Aussaat muß während der ersten 2–4 Wochen warm (ca. +18 bis +22 °C) und gut feucht gehalten werden. Danach ist sie für etwa 4–6 Wochen einer kalten Temperatur zwischen –4 und +4 °C auszusetzen. Lediglich bei den meisten Ranunkelgewächsen sind Temperaturen um –5 °C von Vorteil. Sollten die hier genannten Temperaturen während der Kühlperiode über- oder unterschritten werden, schadet dies nicht, jedoch muß die Kühlperiode dann entsprechend verlängert werden, da der Aufbauprozess der keimauslösenden, hormonartigen Säure während dieser Zeit sich verlangsamt hatte oder still stand. Kann man die Aussaaten in der Kühlperiode mit Schnee bedecken, ist das von Vorteil. Die Temperatur darunter hält sich meistens in dem günstigen Bereich von –4 bis 0 °C, es bleibt feucht, und der schmelzende Schnee „frißt“ an der Samenschale, macht diese poröser, was beim Ausschleiben des Keimes von Vorteil ist. – Nach dieser Kühlperiode dürfen keinesfalls sofort hohe Temperaturen angewandt werden, vielmehr liegt dann der günstigste Temperaturbereich zwischen +5 und +12 °C, auch dann, wenn bereits eine Keimung zu beobachten ist! Also ist der richtige Platz für diese Aussaaten, auch im März/April/Mai noch, das Freiland, der kalte Kasten oder ein Kalthaus.

**Zeitplan****Beste Aussaattermin**

Spätherbst - Vorfrühling (nördl. Hemisphäre, Freiland)

**Aussaat bis Keimung**

10 - 12 Wochen

**Keimung bis Pikieren**

4 - 8 Wochen

**Pikieren bis Topfen**

6 - 10 Wochen

**Aufzucht****Topfgröße(n)**

1-2 Jungpflanzen für 11/12 cm Container

**Dünger**

Mittel (150-200 ppm)