



ALSTROEMERIA aurantiaca

(aurea)

Peruanische Lilie, Inkalilie

Artikel-Nr.: AA274

Portionspreis (ausreicht für 50-100 Pflanzen)	1g-Preis (0,1-9,9g)	10g-Preis (10-99,9g)	100g-Preis (100-999,9g)	1000g-Preis (1000-9999,9g)	10000g-Preis (10000-99999,9g)
4,50€	4,50€	36,00€	-	-	-

Pflanzenbeschreibung

Lebenszyklus	Staudig
Familie	Alstroemeriaceae
Herkunft	Chile
Besondere Merkmale	Wundervolles Farbenspiel von karamelfarben über gold bis orange Töne.
Hauptblütenfarbe	(gelb / gold)
Blütenfarbe	Gelb bis orange
Blütezeit	Juni - August
Winterhärtezon	Z7 - Z10
Belaubung	Mittelgrün, lanzettlich
Habitus/Wuchs	straff aufrecht / horstbildend
Wuchshöhe mit Blüten	50 cm
Pflanzenabstand	45 cm
Bodenansprüche	gut durchlässig / frisch
Standort	
Verwendung	zum Schnitt geeignet

Kulturtipps

Tausendkorngewicht	25 Gramm
Samen pro Gramm	40 (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!)
Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen	50 Gramm (Bei Direktaussaat in Töpfe etc. wird eine größere Menge benötigt)
Aussaatmenge / Platten	3 - 4 pro Zelle
Plattengröße(n)	Aussaatschalen / 72

Keimanleitung

(8) Es handelt sich hier um Staudensamen, der sehr ungleichmäßig keimt auf eine lange Keimperiode verteilt. Hier sind auch besonders Einwirkungen von niederen Temperaturen unter +5°C sehr von Vorteil. Saatgefäße nicht zu früh vernichten. Besonders auf gleichmäßige Feuchtigkeit achten und keiner direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Für Alstroemeria empfehlen wir, die Aussaat 21 Tage bei ca. +30°C aufzustellen. Danach 21 Tage bei +5°C, anschließend ca. +21°C.

Zeitplan

Bester Aussaattermin	Jederzeit (nördl. Hemisphäre, Freiland)
Aussaattermin Zusatz	Warme Temperaturen gefolgt von kalten sind von Vorteil
Aussaat bis Keimung	4 - 8 Wochen
Keimung bis Pikieren	4 - 8 Wochen
Pikieren bis Topfen	6 - 10 Wochen
Rückschnitt beim Topfen	Nicht nötig.

Aufzucht

Topfgröße(n)	1-2 Jungpflanzen für 11/12 cm Container
Vernalisation	Als eine allgemeine Empfehlung für Stauden gilt: Stellen Sie die Pflanzen 6-12 Wochen bei einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 5°C auf. Diese Kühlperiode ist für die Anlage einer Blüte nicht immer notwendig, sie verbessert aber in jedem Fall die Qualität der Pflanzen.
Antreiben	Belichten Sie die Pflanzen ununterbrochen 16 Stunden/Tag. Während kurzer Wintertage sollte nachts eine Lichtphase von 4 Stunden zwischen 22.00 und 02.00 Uhr eingehalten werden. 6-8 Wochen bis zur Blüte.
Dünger	Mittel (150-200 ppm)