



ANDROPOGON scoparius 'Prairie Blues'


(SCHIZACHYRIUM)

Blaues Bartgras, Kleines Prärie gras

Artikel-Nr.: ZA033

Portionspreis (ausreichend für 50-100 Pflanzen)	1g-Preis (0,1-9,9g)	10g-Preis (10-99,9g)	100g-Preis (100-999,9g)	1000g-Preis (1000-9999,9g)	10000g-Preis (10000-99999,9g)
7,20€	22,00€	160,00€	1.280,00€	-	-

Pflanzenbeschreibung

Artikelausprägung	reine Saat
Lebenszyklus	Staudig
Familie	Poaceae
Herkunft	Nordamerika und Nordmexiko
Besondere Merkmale	Graublau, bändchenartiges Laub mit rot-oranger Herbstfärbung. Das feine Laub kann gut für Sträuße verwendet werden. Silberne, aufplusternde Samenhähren. Sehr gut geeignet für Präriepflanzungen. Wärmeliebend und trockenheitsresistent.
Historie	Eingeführt von JELITTO STAUDENSAMEN GmbH 2007, die nordamerikanischen Indianer haben die getrockneten Blätter der Art zur Isolierung ihrer Mokassins verwendet.
Hauptblütenfarbe	(weiß / creme)
Blütenfarbe	Silbrig
Blütezeit	August - Oktober
Winterhärtezonen	Z3 - Z9
Belaubung	Fein, bändchenartig, graublau, orange Herbstfärbung
Habitus/Wuchs	straff aufrecht
Wuchshöhe mit Blüten	100 cm
Pflanzenabstand	60 cm
Bodenansprüche	trocken / gut durchlässig
Standort	
Eigenschaft	Blattschmuckpflanze
Verwendung	zum Schnitt geeignet

Kulturtipps

Tausendkorngewicht	0,95238 Gramm
Samen pro Gramm	1050 (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!)
Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen	3 Gramm (Bei Direktaussaat in Töpfe etc. wird eine größere Menge benötigt)
Aussaatmenge / Platten	3 - 5 pro Zelle
Plattengröße(n)	128 / 288
Keimanleitung	(15) Schnell keimende Saat. Gleichmäßige Feuchtigkeit (nicht naß!) und Temperatur um etwa +20°C. Die Samen nur sehr dünn, ganz feine Saat gar nicht abdecken, aber andrücken. Nach erfolgter Keimung kühler stellen.

Zeitplan

Beste Aussaattermin	Jederzeit (nördl. Hemisphäre, Freiland)
Aussaat bis Keimung	3 - 4 Wochen
Keimung bis Pikieren	4 - 6 Wochen
Pikieren bis Topfen	6 - 8 Wochen
Rückschnitt beim Topfen	Nicht nötig.

Aufzucht

Topfgröße(n)	1-2 Jungpflanzen für 11/12 cm Container / 2-3 Jungpflanzen für 15 cm Container
Vernalisation	Über die Wirkung einer Vernalisation wurde bislang noch nicht hinreichend geforscht. Als eine allgemeine Empfehlung für Stauden gilt: Stellen Sie die Pflanzen 6-12 Wochen bei einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 5°C auf (einige Arten für 15 Wochen). Diese Kühlperiode ist für die Anlage einer Blüte nicht immer notwendig, sie verbessert aber in jedem Fall die Qualität der Pflanzen.
Antreiben	Sollen die Pflanzen nach der Vernalisation angetrieben werden, so sollte die durchschnittliche Tagestemperatur auf 15-17°C erhöht werden, bei einer ununterbrochenen Belichtung von 16 Stunden/Tag. Während kurzer Wintertage sollte nachts eine Lichtphase von 4 Stunden zwischen 22.00 und 02.00 Uhr eingehalten werden.
Dünger	Wenig (100-150 ppm)