



MONARDA Citriodora-Hybr. 'Bergamo'

Indianernessel

Artikel-Nr.: MA195

Portionspreis (ausreicht für 50-100 Pflanzen)	1g-Preis (0,1-9,9g)	10g-Preis (10-99,9g)	100g-Preis (100-999,9g)	1000g-Preis (1000-9999,9g)	10000g-Preis (10000-99999,9g)
4,80€	36,00€	324,00€	-	-	-

Pflanzenbeschreibung

Lebenszyklus	Einjährig
Familie	Lamiaceae
Herkunft	Nordamerika
Auszeichnung	Prämiert mit einer Fleuroselect Auszeichnung.
Besondere Merkmale	Kompakte Pflanze mit intensiv gestaffelten, purpurrosa Blütentrauben. Kurzlebig.
Historie	Die Blätter der Art werden traditionell für Kräutertee verwendet.
Hauptblütenfarbe	(rot / scharlach / purpur)
Blütenfarbe	Purpurrosa
Blütezeit	Juni - September
Blütenreaktion	blüht im 1. Jahr
Winterhärtezonen	Z5 - Z8
Belaubung	Lanzettlich, gezähnt, mit Zitronenduft
Habitus/Wuchs	kompakt / buschig
Wuchshöhe mit Blüten	60 cm
Pflanzenabstand	60 cm
Bodenansprüche	trocken / gut durchlässig / frisch
Standort	 
Verwendung	zum Schnitt geeignet

Kulturtipps

Tausendkorngewicht	0,45455 Gramm
Samen pro Gramm	2200 (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!)
Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen	1 Gramm (Bei Direktaussaat in Töpfe etc. wird eine größere Menge benötigt)



Aussaatmenge / Platten	2 - 3 pro Zelle
Plattengröße(n)	72 / 128
Keimanleitung	(15) Schnell keimende Saat. Gleichmäßige Feuchtigkeit (nicht naß!) und Temperatur um etwa +20°C. Die Samen nur sehr dünn, ganz feine Saat gar nicht abdecken, aber andrücken. Nach erfolgter Keimung kühler stellen.

Zeitplan

Beste Aussaattermin	Jederzeit (nördl. Hemisphäre, Freiland)
Aussaat bis Keimung	2 - 3 Wochen
Keimung bis Pikieren	4 - 6 Wochen
Pikieren bis Topfen	4 - 6 Wochen
Rückschnitt beim Topfen	Einmaliger Rückschnitt, um die Pflanze kompakter zu halten.

Aufzucht

Topfgröße(n)	1 Jungpflanze für 8/9 cm Container / 1-2 Jungpflanzen für 11/12 cm Container
Vernalisation	Für eine Blüte im ersten Jahr ist keine Vernalisation notwendig.
Antreiben	Belichten Sie die Pflanzen ununterbrochen 16 Stunden/Tag. Während kurzer Wintertage sollte nachts eine Lichtphase von 4 Stunden zwischen 22.00 und 02.00 Uhr eingehalten werden. 6-8 Wochen bis zur Blüte.
Dünger	Mittel (150-200 ppm)