



ANTHYLLIS vulneraria var. coccinea

[Red Carpet]


Wundklee

Artikel-Nr.: AA544

Auch erhältlich als: GOLD NUGGET SEED®

Portionspreis (ausreichend für 50-100 Pflanzen)	1g-Preis (0,1-9,9g)	10g-Preis (10-99,9g)	100g-Preis (100-999,9g)	1000g-Preis (1000-9999,9g)	10000g-Preis (10000-99999,9g)
6,00€	6,00€	48,00€	380,00€	-	-

Pflanzenbeschreibung

Artikelausprägung	reine Saat
Lebenszyklus	Staudig
Familie	Papilionaceae
Herkunft	Nordafrika, Europa und Westasien
Besondere Merkmale	Großartig für trockene Standorte. ANTHYLLIS vulneraria var. coccinea bringt eine ganz andere Blütenform in den Steingarten, auf die Steinmauer oder an jeden anderen Platz mit durchlässigem Substrat.
Historie	Wird als Medizinalpflanze in Europa schon seit dem 16. Jahrhundert angebaut.
Hauptblütenfarbe	(rot / scharlach / purpur)
Blütenfarbe	Rot-orange
Blütezeit	Mai - August
Blütenreaktion	blüht im 2. Jahr
Winterhärtezonen	Z5 - Z9
Belaubung	Blaugrün, oval-lanzettlich
Habitus/Wuchs	ausläuferbildend / hängend / niedrig
Wuchshöhe mit Blüten	15 cm
Pflanzenabstand	40 cm
Bodenansprüche	trocken / kiesig / gut durchlässig / alkalisch
Standort	
Verwendung	Bienenfutterpflanze / für Steingärten geeignet

Kulturtipps

Tausendkorngewicht	3,125 Gramm
---------------------------	-------------

Samen pro Gramm	320 (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!)
Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen	8 Gramm (Bei Direktaussaat in Töpfe etc. wird eine größere Menge benötigt)
Aussaatmenge / Platten	3 - 4 pro Zelle
Plattengröße(n)	72 / 128
Keimanleitung	(9) Keimt je nach Art und Herkunft schnell. Wenn jedoch nach 3–4 Wochen die Keimung nicht erfolgt, muß diese Herkunft einer Kühlperiode von 2–4 Wochen ausgesetzt werden. Für die im Himalaya beheimateten Meconopsis ist die Kühlperiode unerlässlich. Sie müssen auch nach erfolgter Keimung noch einige Wochen kühl, unter ca. +12°C, gehalten werden.

Zeitplan

Beste Aussaattermin	Spätherbst - Vorfrühling (nördl. Hemisphäre, Freiland)
Aussaat bis Keimung	4 - 8 Wochen
Keimung bis Pikieren	4 - 8 Wochen
Pikieren bis Topfen	6 - 10 Wochen
Rückschnitt beim Topfen	Nicht nötig.

Aufzucht

Topfgröße(n)	1 Jungpflanze für 8/9 cm Container / 1-2 Jungpflanzen für 11/12 cm Container
Vernalisation	Als eine allgemeine Empfehlung für Stauden gilt: Stellen Sie die Pflanzen 6-12 Wochen bei einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 5°C auf. Diese Kühlperiode ist für die Anlage einer Blüte nicht immer notwendig, sie verbessert aber in jedem Fall die Qualität der Pflanzen.
Antreiben	Belichten Sie die Pflanzen ununterbrochen 16 Stunden/Tag. Während kurzer Wintertage sollte nachts eine Lichtphase von 4 Stunden zwischen 22.00 und 02.00 Uhr eingehalten werden. 6-8 Wochen bis zur Blüte.
Dünger	Wenig (100-150 ppm)