



VIOLA labradorica hort. 'Purpurea'


Labrador-Veilchen

Artikel-Nr.: VA234

Auch erhältlich als: GOLD NUGGET SEED®

Portionspreis (ausreichend für 50-100 Pflanzen)	1g-Preis (0,1-9,9g)	10g-Preis (10-99,9g)	100g-Preis (100-999,9g)	1000g-Preis (1000-9999,9g)	10000g-Preis (10000-99999,9g)
4,00€	8,00€	64,00€	512,00€	-	-

Pflanzenbeschreibung

Lebenszyklus	Staudig
Familie	Violaceae
Herkunft	Nordost-USA, Kanada und Grönland
Besondere Merkmale	Liebliches, dekoratives Laub mit einem purpurnen Farbton verleiht dieser niedrigen Spezies über die gesamte Saison einen guten Eindruck. Sonnig in kälteren Gebieten, Halbschattig anderswo.
Hauptblütenfarbe	(blau)
Blütenfarbe	Porzellanblau
Blütezeit	April - Juni
Winterhärtezonen	Z2 - Z8
Belaubung	Dunkel mit purpurnem Farbton
Habitus/Wuchs	ausläuferbildend / polsterbildend / niedrig
Wuchshöhe mit Blüten	15 cm
Pflanzenabstand	20 cm
Bodenansprüche	feucht / kühl
Standort	
Eigenschaft	Blattschmuckpflanze / Bodendecker
Verwendung	für Steingärten geeignet

Kulturtipps

Tausendkorngewicht	1,05263 Gramm
Samen pro Gramm	950 (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!)
Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen	3 Gramm (Bei Direktaussaat in Töpfe etc. wird eine größere Menge benötigt)

Aussaatmenge / Platten	3 - 4 pro Zelle
Plattengröße(n)	72 / 128
Keimanleitung	(8) Es handelt sich hier um Staudensamen, der sehr ungleichmäßig keimt auf eine lange Keimperiode verteilt. Hier sind auch besonders Einwirkungen von niederen Temperaturen unter +5°C sehr von Vorteil. Saatgefäße nicht zu früh vernichten. Besonders auf gleichmäßige Feuchtigkeit achten und keiner direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Für Alstroemeria empfehlen wir, die Aussaat 21 Tage bei ca. +30°C aufzustellen. Danach 21 Tage bei +5°C, anschließend ca. +21°C.

Zeitplan

Bester Aussaattermin	Spätherbst - Vorfrühling (nördl. Hemisphäre, Freiland)
Keimung bis Pikieren	4 - 8 Wochen
Pikieren bis Topfen	6 - 10 Wochen
Rückschnitt beim Topfen	Nicht nötig.

Aufzucht

Topfgröße(n)	1 Jungpflanze für 8/9 cm Container / 1-2 Jungpflanzen für 11/12 cm Container
Vernalisation	Über die Wirkung einer Vernalisation wurde bislang noch nicht hinreichend geforscht. Als eine allgemeine Empfehlung für Stauden gilt: Stellen Sie die Pflanzen 6-12 Wochen bei einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 5°C auf (einige Arten für 15 Wochen). Diese Kühlperiode ist für die Anlage einer Blüte nicht immer notwendig, sie verbessert aber in jedem Fall die Qualität der Pflanzen.
Antreiben	Diese Art muss nicht angetrieben werden.
Dünger	Mittel (150-200 ppm)